BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº 2 / ABRIL 2026.
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet :**
  http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
- **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
- **Boletines de viticultura y enología**
- **Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, granizadas...)**

A 24 de abril de 2026

Las condiciones meteorológicas particulares de nuestra zona generan que los problemas sanitarios de mayor importancia van a estar relacionados con las enfermedades, especialmente los hongos MILDIU, OIDIO y BOTRITIS, aparte de los HONGOS DE MADERA. Las plantas van a presentar sensibilidad al mildiu y oidio a partir de 10-20 centímetros de brote, y en el caso de botritis, se deberá de prestar atención en floración y especialmente a partir del envero.
Desde el Centro de Protección Vegetal de Derio se informará de la evolución de los distintos patógenos de la vid a lo largo de la campaña.

En el Boletín de enero se informó de las principales mod**ificaciones en el registro de productos fitosanitarios**.

Por otra parte, se ha de prestar atención a la existencia de posibles resistencias de los hongos a ciertos fitosanitarios. En 2020, 2023 y 2025 se realizaron análisis de resistencias de mildiu en varias plantaciones. En base a los resultados obtenidos, la situación es variable según la plantación, pero en todas ellas hay un elemento común como es un muy alto nivel de resistencia a la familia de las Amidas del Acido Carboxílico (iprovalicarb, mandipropamida, valifenalato) y a la familia de las fenilamidas (metalaxil, metalaxil-M, benalaxil y benalaxil-M) y creciente otras familias de fungicidas. Ante esta situación, se ha de tener precaución con el uso de estos fungicidas en nuestras condiciones.

En los estados fenológicos actuales se deberán tener en cuenta los siguientes patógenos:

EXCORIOSIS, NECROSIS Y MANCHAS DE LOS SARMIENTOS:

Es poco habitual, pero si durante la poda se han apreciado manchas necróticas y zonas de madera blanquecina principalmente en los primeros entrenudos, algunas de estas estructuras pueden deberse a hongos patógenos, principalmente excoriosis, que pueden generar alteraciones durante la brotación de las yemas y estrangulamiento de los pámpanos. De esta forma, en las **PARCELAS CON ESTA SINTOMATOLOGÍA SE RECOMIENDA REALIZAR UNO O DOS TRATAMIENTOS EN LOS ESTADOS C/D Y D/E (desde punta verde hasta hojas extendidas).** Se deberán emplear productos que contengan la materia activa **FOLPET.**

MILDIU:
Es conveniente iniciar los tratamientos en estado fenológico E-F (brotes de más de 10 cm.). En estos momentos la variedad Hondarrabi Zuri en la mayor parte de ubicaciones está estado F-G y la mayor parte de productores han dado ya el primer tratamiento antimildiu e incluso el segundo en algunos casos. Por otra parte, informaremos en cuanto se detecte la primera mancha.

OIDIO:
En variedades especialmente sensibles o con daños en años anteriores es interesante **realizar un primer tratamiento antioidio** en estado fenológico **E-F**. Consultar la relación de **fungicidas antioidio del Grupo O** de la Guía de Tratamientos del 2026.

ARAÑA ROJA:
En plantaciones en las que en la campaña anterior ha habido problemas con este ácaro en estado C-D o 3-4 cm de brote puede aplicar p.ej. el acaricida Flash UM (fenpiroximato 5%) o Award (fenpiroximato 6,24% + hexitiazox 3,12%), Diablo o Jalisco (hexitiazox 25%), o aceite parafinico al 40%, 65% o 80%.

ERINOSIS-ACARIOSIS:

El tratamiento contra esta plaga se debe realizar en estado C-D (entre punta verde y salida de hojas), solamente en aquellas parcelas que han tenido una incidencia importante de la plaga. Tratamientos posteriores no serán efectivos pues los eriófidos se resguardarán en las agallas que forman las hojas, donde no les afectan los tratamientos. Producto: Flash UM (fenpiroximato 5%) o Award (fenpiroximato 6,24% + hexitiazox 3,12%) o aceite parafínico (varios) al 40, 65 u 80%.

MANTENIMIENTO DEL SUELO. Eliminar la competencia de la cubierta vegetal.