BOLETÍN DE VITICULTURA Nº 3 / MAYO 2026
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet :**
  http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
- **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
- **Boletines de viticultura y enología**
  - **Mensajes SMS ante incidencias especiales (detección de primera mancha de mildiu, granizadas...)**

A fecha 22/05/2026

En los estados fenológicos actuales se deberán tener en cuenta los siguientes patógenos:

MILDIU: El 25/05/2026 se observaron las **primeras manchas de mildiu en vid** en Lezama y el 26/05/2026 en Gueñes. Posteriormente, a pesar de las lluvias y elevada humedad de estas semanas, las temperaturas han sido frescas y por ello no se ha producido una generalización de las infecciones. En los próximos días se espera una subida fuerte de las temperaturas, incluso por encima de los 25ºC, lo cual frenará también la extensión de las infecciones. Sin embargo, estamos en el periodo previo a la floración, que es una fase muy sensible al mildiu por lo que debemos vigilar las plantaciones y seguir renovando los tratamientos.

Control: durante **esta época de fuerte crecimiento vegetativo de la viña y hasta el cuajado de la flor** se recomienda la utilización de **fungicidas antimildiu sistémicos del Grupo M1** de la Guía de Tratamientos 2026. Los productos sistémicos tienen buena eficacia, pero el hongo posee una gran facilidad de crear resistencias, por esta razón, no se debe abusar de su empleo, y se deben alternar materias activas de distintas familias químicas. Estos productos sistémicos tienen capacidad de parada o de stop de 2-4 días una vez se ha generado la infección, no obstante, su mejor comportamiento se obtiene utilizándolos preventivamente. La persistencia de los productos sistémicos se considera en torno a los 10 días no obstante en caso de presión elevada del hongo junto con un crecimiento rápido de la vegetación se deberá reducir el intervalo de tratamientos en 2 días, esto es a los 8 días.

Se deberán de mojar bien los órganos de la cepa utilizando maquinaria adecuada y perfectamente calibrada.

OIDIO: el **inicio de floración** es el siguiente momento crítico de esta enfermedad, pero en cualquier caso, de producirse condiciones y/o detectar síntomas de la enfermedad, se recomienda tratar con **fungicidas antioidio del Grupo O** de la Guía de Tratamientos del 2026.

BOTRITIS: en **el entorno de la floración** (estados fenológicos: I-J) –primera quincena de junio habitualmente- y especialmente en caso de previsión de lluvias y/o condiciones de elevada humedad, será necesario proteger los racimos. Utilizar **fungicidas antibotríticos del Grupo B** de la Guía de Tratamientos 2026.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*): en general en nuestros viñedos apenas se producen daños por esta plaga, y aún menos es esta época en la que aún no tenemos bayas en el racimo.