4. BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº4 / JUNIO 2026
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet:** http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
- **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
- **Boletines de viticultura y enología**
- **Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, granizadas...)**

A fecha 25 de junio, en general, las condiciones climáticas durante la floración han sido buenas lo que ha propiciado una buena polinización y cuajado.

En los estados fenológicos actuales se deberán tener en cuenta los siguientes patógenos:

MILDIU: hasta el momento no se han observado infecciones secundarias importantes en las plantaciones.
Control**: a partir de la floración** se recomienda la utilización de **fungicidas antimildiu penetrantes del Grupo M2** de la Guía de Tratamientos 2026. Estos productos tienen capacidad de parada o de stop de 2 días una vez se ha generado la infección, no obstante, su mejor comportamiento se obtiene utilizándolos preventivamente. La persistencia de los productos penetrantes se considera en torno a los 8 días no obstante en caso de presión elevada del hongo junto con un crecimiento rápido de la vegetación se deberá reducir el intervalo de tratamientos en 2 días.

BOTRITIS: es importante realizar un tratamiento antes del cierre de los racimos. Utilizar fungicidas antibotríticos del Grupo B de la Guía de Tratamientos 2026. Se recuerda que **la fecha límite de uso del antibotrítico Prolectus es el 15/7/2026**.

OIDIO: en estado fenológico de bayas de tamaño de guisante (K) se recomienda realizar un tratamiento preventivo contra esta enfermedad. Posteriormente, y hasta el envero, revisad las plantaciones y renovad los tratamientos. Usar **fungicidas antioídio del Grupo O** de la Guía de Tratamientos del 2026.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*): en nuestros viñedos apenas se producen daños. Aún así se recomienda revisar las flores y los racimos para detectar presencia de sedas y larvas y tratar sólo en caso de observar presencia de larvas en las flores o el racimo.

ARAÑA AMARILLA *(Eotetranychus carpini) y* **ARAÑA ROJA** *(Panonychus ulmi).* Hasta el momento apenas se han observado ataques de estas plagas. Pero, en caso necesario, se recomienda el uso de acaricidas como por ejemplo:
Exitox, Nissorum, Perfil, Shoshi, (Hexitiazox 10%) o Jalisco SC, Diablo max (Hexitiazox25%): controlan huevos,larvas, y ninfas (no controlan adultos)
Flas UM (Fenpiroximato 5,12%) controla larvas, ninfas y adultos, Award (Fenpiroximato 6,24% + Hexitiazox 3,12%: controla huevos,larvas, ninfas y adultos.
El azufre mojable también es interesante ya que nos ayuda para el control de oidio.
En algunos casos será necesario mezclar dos, para controlar todas las formas (huevo, larva, ninfa y adulto).
En el caso de los acaricidas es importante también alternar las materias activas y forma de actuación, para evitar problemas de resistencias.

Os recordamos que es fundamental mantenerse informado de las novedades que se vayan produciendo en este sentido para lo cual se puede consultar a los servicios técnicos de la Asociación, de Diputación o consultar la página web del MAPA:
https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb

OPERACIONES DE CULTIVO **Poda en verde:** eliminación de hijuelos, supresión de chupones y aclareo de brotes.

Se deben de mojar bien los órganos de la cepa utilizando maquinaria adecuada y perfectamente calibrada. Recordar la importancia de adecuar el volumen de caldo al volumen de masa vegetal.