BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº5 / JULIO 2026
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet :** http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
- **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
- **Boletines de viticultura y enología**
- **Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, granizadas...)**

A fecha 10 de julio, el viñedo está principalmente en el estado fenológico de cierre de racimo. En esta fase, los racimos continúan siendo muy sensibles a nuevas infecciones de mildiu y oídio. Hasta el momento, el viñedo en general está muy sano con pocos problemas fitosanitarios y el envero está cercano. En este punto recordad que, a partir del envero, ni mildiu ni oídio causan daños en el racimo.

En los estados fenológicos actuales se deberán tener en cuenta los siguientes patógenos:

MILDIU: como se ha comentado, hasta el momento y en general la incidencia de la enfermedad es baja.

Control: **a partir de la floración** de los racimos se recomienda la utilización de **fungicidas antimildiu penetrantes del Grupo M2** de la Guía de Tratamientos 2026. Estos productos tienen capacidad de parada o de stop de 2 días una vez se ha generado la infección, no obstante, su mejor comportamiento se obtiene utilizándolos preventivamente. La persistencia de los productos penetrantes se considera en torno a los 8 días, pero en caso de presión elevada del hongo se deberá reducir el intervalo de tratamientos en 2 días.
Se deberán de mojar bien los órganos de la cepa utilizando maquinaria adecuada y perfectamente calibrada. Se deberá de realizar **labores culturales adecuadas** (deshojados, desnietados, desbroces...)

OIDIO: el estado actual de cierre de racimo es muy sensible para esta enfermedad. En caso de producirse condiciones y/o detectar síntomas tratar con **fungicidas antioidio del Grupo O** de la Guía de Tratamientos del 2026. Prestar especial atención a esta enfermedad en los viñedos que sufrieron daños en campañas anteriores.

BOTRITIS: es importante realizar un tratamiento **antes del cierre de los racimos**. Utilizar **fungicidas antibotríticos del Grupo B** de la Guía de Tratamientos 2026.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*):
En general, en nuestros viñedos esta plaga apenas produce daños. Sin embargo, considerado el tiempo caluroso de las últimas semanas **es posible la aparición de algunos daños, por lo que se recomienda la revisión de los racimos**. En las últimas semanas, el nivel de capturas es medio-bajo.

ARAÑA AMARILLA *(Eotetranychus carpini)* y **ARAÑA ROJA** *(Panonychus ulmi)*. **En varias plantaciones se observan síntomas del ataque de esta plaga**. En caso necesario, se recomienda el uso, por ejemplo, de los siguientes acaricidas:
Exitox, Nissorum, Shoshi (Hexitiazox 10% o 25%) : controla huevos,larvas, y ninfas (no controla adultos)
Award (fenpiroximato 6,24% + Hexitiazox 3,12%) : controla huevos,larvas, ninfas y adultos.
El azufre mojable también es interesante ya que nos ayuda para el control de oidio.
En algunos casos será necesario mezclar dos, para controlar todas las formas (huevo, larva, ninfa y adulto).
En el caso de los acaricidas es importante alternar las materias activas y forma de actuación, para evitar problemas de resistencias.

OPERACIONES DE CULTIVO. Poda en verde: eliminación de hijuelos, supresión de chupones y aclareo de brotes Eliminar las hojas próximas a los racimos, pero no excesivamente para evitar golpes de sol. Realizar desbroces frecuentes. Todas estas labores procuran evitar condiciones de exceso de humedad en torno a las plantas, y por otra parte **mejorar la eficacia de los tratamientos**.

SE DEBEN DE MOJAR BIEN LOS ÓRGANOS DE LA CEPA UTILIZANDO MAQUINARIA ADECUADA Y PERFECTAMENTE CALIBRADA. RECORDAR LA IMPORTANCIA DE ADECUAR EL VOLUMEN DE CALDO AL VOLUMEN DE LA MASA VEGETAL.