BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº 6 / AGOSTO 2026
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet:**
  http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
- **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
- **Boletines de viticultura y enología**
- **Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, granizo ...)**

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL DE DERIO 944541009

A fecha 7 de agosto.

Este año el envero viene adelantado por lo que los controles de maduración se iniciarán la semana del 17 de agosto. Los resultados se publicarán en los canales habituales.

Atendiendo a la fecha de recolección, ATENCIÓN a los plazos de seguridad de los productos

MILDIU: en general, este año la presión de la enfermedad ha sido baja, aunque en las 2-3 últimas semanas en algunas plantaciones se observan daños por mildiu larvado. Recordad que hasta el envero el racimo sigue siendo sensible, aunque a estas alturas en los viñedos sanos no se producirán daños de consideración.

En caso necesario, se recomienda la utilización de fungicidas antimildiu penetrantes del Grupo M2 de la Guía de Tratamientos 2026 hasta el inicio del envero.

A partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, recomendándose a partir de esta época fungicidas antimildiu de contacto del Grupo M3 basados en formulados de cobre.

OIDIO: este año y en general la incidencia de esta enfermedad ha sido baja. A estas alturas en los viñedos sanos no se producirán daños de consideración ya que como en el caso del mildiu, a partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, por lo que podemos dejar de realizar tratamientos antioídio.

BOTRITIS: a partir del envero el riesgo de ataque de botritis se incrementa considerablemente, especialmente si se producen condiciones de elevada humedad y lluvias. Utilizar fungicidas antibotríticos del Grupo B de la Guía de Tratamientos 2026 alternando distintas materias activas. Se recuerda que **la fecha límite de uso del antibotrítico Prolectus fue el 15/7/2026 y que actualmente está fuera de Registro**.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*):

En general en nuestros viñedos apenas se producen daños por lo que sólo se recomienda tratar si se observa presencia de larvas en el racimo.

ACAROS: en algunas plantaciones se han observado daños por araña amarilla (*Eotetranychus carpini*). En caso de intervenir aplicar productos como el azufre mojable o acaricidas específicos como Flash UM (Fenpiroximato 5,12%) o Diablo, o Jalisco o Tiazosac (Hexitiazox 25,87%)

OPERACIONES DE CULTIVO Además de los desbrozados frecuentes, valorar la conveniencia de realizar el deshojado de las hojas próximas a los racimos, considerando el posible daño en racimo de los golpes de sol.

Análisis Foliares: NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario Euskal Nekazal Ikerketaren eta Garapenaren Institutoa	
Fecha entrega: del 31 de agosto al 4 de septiembre Lugar: Neiker Derio Horario: 8,30-14.00 Precio análisis Bialtxa: 32,3 € + IVA Precio análisis no socio: 92,22 € + IVA	- Hojas con peciolo. - 3ª hoja a partir del 1er racimo. - Recoger entre 30-60 hojas por muestra y variedad. Recoger 1 hoja por planta.