

Guía de tratamientos recomendados para manzanos 2024

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Observaciones
A	Pulgones / Araña roja	Aceite de parafina	Varios	
A-B	Moteado / Chancros	Cobre	Varios	
C-D	Moteado / Chancros	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Araña roja	Clofentezin Hexitiazox	Apolo 50 SC*, Acaristop*, Clofentezin 50SC Diablo, Jalisco, Perfil, Exitox, Nissorun, Nissorun Flow, Shoshi	
	Pulgones	Flonicamida Pirimicarb*	Teppeki Aphox*, Kilsec*	* Realizar un solo tratamiento al año.
G	Moteado y Oidio	Grupo M.O.: fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo.		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil Ciprodinil+fludioxonil* Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Tebuconazol* Tetraconazol Trifloxistrobin	Bellis* Chorus Switch*, Astound*, Serenva* Score 25 EC, Lxor 25, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Revyona Folicur 25 WG* Emerald, Galileo, Brek Flint, Consist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. <u>Alternar</u> el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias. *Controla también monilia
	Monilia	Grupo MON: fungicidas con efecto antimonilia		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxonil	Bellis* Switch*, Astound*	*Controla también moteado y oidio
	Pulgones	Flonicamida Lambda -cihalotrin Spirotetramat	Teppeki Karate Zeon*, Kendo*, Lamdex* Movento Gold**	* Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado. **Desde caída de pétalos a inicio de maduración.
Tratar cada 12 días en función de la necesidad	Moteado y oidio	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.O.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	Agusanado Avisos en telef. 94- 4066879	Spinosad Clorantraniliprol Emamectina benzoato	Spintor 480 SC* Coragen**, Voliam** Affirm Opti***	*Realizar un solo tratamiento al año. ** Controla también minadoras. Máximo dos aplicaciones anuales *** Máximo tres aplicaciones anuales
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	Araña roja Avisos en telef. 94- 406 68 79	Clofentezin* Fenpiroximato Hexitiazox	Apolo 50SC*, Acaristop*, Clofentecin 50 SC Flash UM** Diablo, Jalisco, Perfil, Exitox, Nissorun, Nissorun Flow, Shoshi	Realizar máximo un tratamiento al año con cada producto para evitar resistencias. *No controla adultos. ** Realizar un solo tratamiento al año.
Engrosamiento de frutos - Maduración	Monilia	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	Moteado	Grupo MOT: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".		
		Ditianona	Delan WG	
Enfermedades postcosecha	Fludioxonil	Geoxe 50 WG		
50% caída de hojas	Moteado	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg. de cobre y 10 kg. de urea del 46 % por 100 litros de caldo.