Consulta de la evolución fitosanitaria del cultivo en internet (meses de mayo a octubre)
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA

Bizkaia foru aldundia diputación foral

Guía de tratamientos recomendados para manzanos 2026

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o…)	Producto comercial	Observaciones
A	**Pulgones / Araña roja**	Aceite de parafina	Varios	
A-B	**Moteado / Chancros**	Cobre	Varios	
C-D	**Moteado / Chancros**	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Araña roja	Hexitiazox	Diablo, Perfil, Exitox, Nissorun Nissorun Flow, Shosi, Petiax	
	Pulgones	Acetamiprid Flonicamida Pirimicarb*	Epik, Mospilan Teppeki, Afinto Aphox*, Kilsec*	* Realizar un solo tratamiento al año.
G	**Moteado y Oidio**	**Grupo M.O.: fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo.**		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil Ciprodinil+fludioxonil* Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Tebuconazol* Tetraconazol Trifloxistrobin	Bellis* Chorus Switch*, Astound*, Serenva* Score 25 EC, Lexor 25, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Revyona Folicur 25 WG* Emerald, Galileo, Domark Evo Flint, Consist, Twist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. Alternar el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias. *Controla también monilia
	Monilia	**Grupo MON: fungicidas con efecto antimonilia**		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxonil	Bellis* Switch*, Astound*	*Controla también moteado y oidio
	Pulgones	Acetamiprid Flonicamida Lambda –cihalotrin	Epik, Mospilan Teppeki, Afinto Karate Zeon*, Kendo*, Lamdex 2,5 WG*	* Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado.
Tratar cada 12 días en función de la necesidad	**Moteado y oidio**	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.O.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	**Agusanado** **Avisos en telef. 94- 4066879**	Spinosad Clorantraniliprol Emamectina benzoato	Spintor 480 SC* Coragen 20SC**, Voliam**, Shenzi200SC** Affirm Opti***	*Realizar un solo tratamiento al año. ** Controla también minadoras. Máximo dos aplicaciones anuales *** Máximo tres aplicaciones anuales
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	**Araña roja** **Avisos en teléf. 94- 406 68 79**	Fenpiroximato Hexitiazox	Flash UM** Diablo, Perfil, Exitox, Nissorun, Nissorun Flow, Shosi, Petiax	Realizar máximo un tratamiento al año con cada producto para evitar resistencias. *No controla adultos. ** Realizar un solo tratamiento al año.
Engrosamiento de frutos - Maduración	**Monilia**	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	Moteado	**Grupo MOT.: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".**		
		Ditianona + Fosfonatos de potasio	Delan Pro	
	Enfermedades postcosecha	Fludioxonil	Geoxe 50 WG	
50% caída de hojas	**Moteado**	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg. de cobre y 10 kg. de urea del 46 % por 100 litros de caldo.

LANDARE-BABESERAKO ZENTROA
CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL
Parque Tecnológico. Ibaizabal Bidea, edificio 502
48160 DERIO
Tel.: 94-454 10 09
e-mail: sanidad.vegetal@bizkaia.eus

- **Granizada**: realizar cuanto antes un tratamiento fungicida con folpet o captan.
- **Contestador automático** del Centro de Protección Vegetal: 94- 406 68 79. Ofrece información semanal de la evolución de los distintos patógenos durante la campaña. Llamar a partir del 1 de Mayo.
- Guía confeccionada según actualización del **MAPA del 26/01/2026.**