

Guía de tratamientos recomendados para perales 2023

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Observaciones
A	Pulgones / Psila / Erinosis	Aceite de parafina	Varios	
A-B	Moteado / Chancros / Bacteriosis	Cobre	Varios	
C-D	Moteado / Chancros / Bacteriosis	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Erinosis	Azufre mojable Fenproxiato	Varios Flash UM*	*Realizar un solo tratamiento al año.
	Pulgones	Fluconamid Pirimicarb Spirotetramat	Teppeki, Afinto Aphox, Kilsec Movento gold*	*Uso. Desde caída de pétalos hasta inicio de maduración Controla también psila
G	Moteado	Grupo M: fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo.		
		Ciprodinil Ciprodinil+Fludioxinil Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Tebuconazol Tetraconazol Trifloxistrobin	Chorus Switch*, Astound* Serenva* Score 25 EC, Lexor, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Folicur 25 WG Emerald, Galileo Flint, Consist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. <u>Alternar</u> el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias. *Controla también monilia.
	Monilia	Grupo MON: fungicidas con efecto antimonilia		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxinil	Bellis* Switch*, Astound*	*Controla también moteado.
	Stemphylium	Grupo S: fungicidas con efecto contra stemphylium		
Ciprodinil+Fludioxinil Fludioxinil Kresoxim-metil Trifloxistrobin		Switch*, Astound* Geoxe Stroby WG, Discus Flint, Consist	*Controla también monilia.	
Pulgones	Fonicamid Lambda-cihalotrin Spirotetramat	Teppeki, Afinto Karate Zeon*, Kendo* Movento Gold**	*Controla también psila y agusanado. Máximo una aplicación anual. **Aplicar desde caída de pétalos a inicio de maduración. También tiene efecto de control sobre psila y cochinillas.	
Tratar cada 12 días en función de la necesidad	Moteado	Fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	Agusanado Avisos en telef. 94-406 68 79	Spinosad Abamectina + clorantropilol Clorantropilol	Spintor 480 SC Voliam targo** Coragen **, Voliam**	*Efecto contra pulgones y psila. **Controlan también psila y minadoras Máximo dos aplicaciones anuales.
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	Psila Avisos en telef. 94-406 68 79	Abamectina Spirotetramat Spinetoram	Apache, Cal Ex Evo, Bermectine Movento Gold Delegate WG*	*Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado.
Engrosamiento de frutos - Maduración	Monilia	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
	Moteado	Grupo MOT: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".		
Ditianona		Delan WG	Tipo de acción penetrante. Realizar el tratamiento en las 36 horas posteriores al comienzo de las lluvias.	
50% caída de hojas	Moteado	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg, de cobre y 10 kg, de urea del 46 % por 100 litros de caldo.