

## Guía de tratamientos recomendados para perales 2024

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Observaciones
A	Pulgones / Psila / Erinosis	Aceite de parafina	Varios	
A-B	Moteado / Chancros / Bacteriosis	Cobre	Varios	
C-D	Moteado / Chancros / Bacteriosis	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Erinosis	Azufre mojable Fenproximato	Varios Flash UM*	*Realizar un solo tratamiento al año.
	Pulgones	Fonicamida Pirimicarb Spirotetramat	Tepeki Aphox, Kilsec Movento Gold*	*Uso. Desde caída de pétalos hasta inicio de maduración Controla también psila
G	Moteado	<b>Grupo M: fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo.</b>		Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia.  Alternar el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias.  *Controla también monilia.
		Ciprodinil Ciprodinil+Fludioxinil Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Tebuconazol* Tetraconazol Trifloxistrobin	Chorus Switch*, Astound*, Serenva* Score 25 EC, Lector, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Revyona Folicur 25 WG* Emerald, Galileo, Brek Flint, Consist	
	Monilia	<b>Grupo MON: fungicidas con efecto antimonilia</b>		*Controla también moteado.
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxinil	Bellis* Switch*, Astound*	
	Stemphylium	<b>Grupo S: fungicidas con efecto contra stemphylium</b>		*Controla también monilia.
Ciprodinil+Fludioxinil Fludioxinil Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Trifloxistrobin		Switch*, Astound* Geoxe Stroby WG, Discus Revyona Flint, Consist		
Pulgones	Fonicamida Lambda-cihalotrin Spirotetramat	Tepeki Karate Zeon*, Kendo*, Lamdex* Movento Gold**	*Controla también psila y agusanado. Máximo una aplicación anual. **Aplicar desde caída de pétalos a inicio de maduración. También tiene efecto de control sobre psila y cochinillas.	
Tratar cada 12 días en función de la necesidad	Moteado	Fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	Agusanado  Avisos en telef. 94-406 68 79	Spinosad Clorantpriliprol	Spintor 480 SC Coragen*, Voliam*	*Controlan también psila y minadoras Máximo dos aplicaciones anuales.
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	Psila  Avisos en telef. 94-406 68 79	Spirotetramat Spinetoram	Movento Gold Delegate WG*	*Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado.
Engrosamiento de frutos - Maduración	Monilia	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
	Moteado	<b>Grupo MOT.: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".</b>		Tipo de acción penetrante. Realizar el tratamiento en las 36 horas posteriores al comienzo de las lluvias.
Ditianona		Delan WG		
50% caída de hojas	Moteado	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg, de cobre y 10 kg, de urea del 46 % por 100 litros de caldo.