Consulta de la evolución fitosanitaria del cultivo en internet (meses de mayo a octubre)
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA

Bizkaia foru aldundia diputación foral

Guía de tratamientos recomendados para perales 2026

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o…)	Producto comercial	Observaciones
A	**Pulgones / Psila / Erinosis**	Aceite de parafina	Varios	
A-B	**Moteado / Chancros / Bacteriosis**	Cobre	Varios	
C-D	**Moteado / Chancros / Bacteriosis**	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Erinosis	Azufre mojable Fenpiroximato	Varios Flash UM*	*Realizar un solo tratamiento al año.
	Pulgones	Acetamiprid Flonicamida Pirimicarb	Epik*, Mospilan* Teppeki, Afinto Aphox, Kilsec	*Controla también psila
G	**Moteado**	**Grupo M: fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo.**		
		Ciprodinil Ciprodinil+Fludioxinil Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Tebuconazol* Tetraconazol Trifloxistrobin	Chorus Switch*, Astound*, Serenva* Score 25 EC, Lexor, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Revyona Folicur 25 WG* Emerald, Galileo, Domark Evo Flint, Consist, Twist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. Alternar el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias. *Controla también monilia.
	Monilia	**Grupo MON: fungicidas con efecto antimonilia**		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxonil	Bellis* Switch*, Astound*	*Controla también moteado.
	Stemphylium	**Grupo S.: fungicidas con efecto contra stemphylium**		
		Ciprodinil+Fludioxinil Fludioxonil Kresoxim-metil Mefentrifluconazol Trifloxistrobin	Switch*, Astound* Geoxe Stroby WG, Discus Revyona Flint, Consist, Twist	*Controla también monilia.
	Pulgones	Acetamiprid Flonicamida Lambda-cihalotrin	Epik*, Mospilan* Teppeki, Afinto Karate Zeon**, Kendo**, Lamdex 2,5 WG**	*Controla también psila **Controla también psila y agusanado. Máximo una aplicación anual.
Tratar cada 12 días en función de la necesidad	**Moteado**	Fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	**Agusanado** **Avisos en telef. 94-406 68 79**	Spinosad Clorantraniliprol	Spintor 480 SC Coragen 20 SC*, Voliam*, Shenzi200 SC*	*Controlan también psila y minadoras Máximo dos aplicaciones anuales.
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	**Psila** **Avisos en telef. 94-406 68 79**	Acetamiprid	Epik, Mospilan	
Engrosamiento de frutos - Maduración	**Monilia**	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	Stemphylium	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
	Moteado	**Grupo MOT.: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".**		
		Ditianona + fosfonatos de potasio	Delan Pro	
50% caída de hojas	**Moteado**	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg, de cobre y 10 kg, de urea del 46 % por 100 litros de caldo.

LANDARE-BABESERAKO ZENTROA
CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL
Parque Tecnológico. Ibaizabal Bidea, edificio 502
48160 DERIO
Tel.: 94-454 10 09
e-mail: sanidad.vegetal@bizkaia.eus

- **Granizada**: realizar cuanto antes un tratamiento fungicida con captan o folpet.
- **Contestador automático** del Centro de Protección Vegetal: 94-4066879. Ofrece información semanal de la evolución de los distintos patógenos durante la campaña. Llamar a partir del 1 de mayo.
- Guía confeccionada según actualización del **MAPA del 26/01/2026.**