Consulta de la evolución fitosanitaria del cultivo en internet (meses de mayo a octubre)
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

GUIA DE TRATAMIENTOS RECOMENDADOS VID-TXAKOLI 2026

Estado fenológico	Plaga o enferm.		Materia activa (insecticida, fungicida o…)	Producto comercial	Actividad	Observaciones
A	**Heridas poda**		Resinas cicatrizantes	Varios		
C-D	**Excoriosis**		Folpet	Varios		
	Acariosis / Erinosis		Fenpiroximato	Flash UM	Actividad eriofidos y tetraniquidos Máx. 1 aplic/año	Por contacto e ingestión
E (+15 cm brote)	**Mildiu**	**M1**	**Grupo M1: Fungicidas antimildiu sistémicos** (mezclados con materias activas de contacto y/o penetrante según formulación).			
			Benalaxil-M + folpet	Fantic F**, Capri F**, Tempio F**	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	Tienen capacidad de penetración y movimiento en la planta.
			Benalaxil M + cobre	Fantic A, Tempio A	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	No se lavan si trascurre 1 hora sin llover después de tratar.
			Ciazofamida + fosfonato disódico	Mildicut Max	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año	Pueden generarse resistencias – Alternar materias activas.
			Cimoxanilo + fosetil-Al + zoxamida	Electris Trio WDG	Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic./año	* No mezclar con otros productos.
			Fluopicolida + fosetil-Al	Profiler	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	** No autorizado en parral de vid.
			Folpet + valifenalato (AAC)	Valis F*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	AAC: Amidas del Ácido Carboxílico. Máx. 3 tratam./año incluidos grupo M1 y M2.
			Fosetil-Al + cimoxanilo + folpet	Mikal-Plus, Pearze Triple	Prev. y curativo. Máx. 1 aplic/año (máx. 1,1 kg/ha)	
			Fosfonato potásico	Cuneb, Aquicine	Preventivo. Máx. 3 aplic/año	
			Fosfonato potásico + ditianona	Delan Pro	Preventivo. Máx. 1 aplic/año	
			Metalaxil + folpet	Sponsor combi, Metix	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	
			Metalaxil-M + folpet	Folpan Gold, Ridomil Gold Combi	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	
F-G	**Mildiu**	**M1**	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del **grupo M1**.			
	Oidio +Ar. roja/ acariosis		Azufre	Varios		
			Fenpiroximato	Flash UM		
	Oidio	**O**	**Grupo O: Fungicidas antioidio.**			
			Boscalida* (7)	Cantus, Lozzare	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	Grupos químicos (distintos códigos FRAC):
			Boscalida + kresoxin-metil (7+11)	Collis, Actum	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	(3)
			Bupirimato (8)	Nimrod Quattro	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	(5)
			Ciflufenamid + difenoconazol (U06+3)	Dynali	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 2 aplic/año	(7)
			Fluopyram* (7)	Luna Privilege*	Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año	(8)
			Fluxapyrosad (7)	Sercadis	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	(11)
			Kresoxim-metil (11)	Stroby WG, Dedalo WG,Tactic, Allegro Top	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	(13) (29)
			Mefentrifluconazol (3)	Revyona	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	(50)
			Meptildinocap (29)	Karathane Star	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 4 aplic/año	(U06)
			Metrafenona (50)	Vivando, Attenzo Star	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	No realizar al año más de dos tratamientos con productos de un mismo grupo químico.
			Penconazol (3)	Topas 200 EW	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	* Controla también botritis.
			Piriofenona (50)	Kusabi	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	**KARATHANE STAR fecha límite de uso: 30/09/2026.
			Proquinazid (13)	Talendo	Preventivo. Máx. 3 aplic/año	
			Proquinazid + tetraconazol (13+3)	Talendo Extra	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	
			Spiroxamina (5)	Spirox 500 EC, Prosper EC, Recatium	Preventivo, curativo y erradicante. 2 aplic/año	
			Tebuconazol* (3)	Folicur 25EW*,Tenor*,Darcos*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	
			Tebuconazol* (3)	Song*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	
			Tebuconazol*+trifloxistrobin (3+11)	Flint Max*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	
			Trifloxistrobin (11)	Flint, Consist, Twist	Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año	
I (inicio floración)	**Mildiu**	**M1**	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del **grupo M1**.			
	Botritis	**B**	**Grupo B: Fungicidas antibotriticos**			
			Ciprodinil	Qualy	Prev. y curativo. Máx. 2 aplic/año	Pueden generarse resistencias – Alternar materias activas.
			Ciprodinil + fludioxonil	Switch, Astound	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año	Para el control de la botritis es muy importante realizar deshojados en torno a los racimos.
			Ciprodinil + tebuconazol	Benelus*, Netón*	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año	* Controla también oidio.
			Eugenol+geraniol+timol	Araw	Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año	
			Fenhexamida	Teldor, Qentivia	Preventivo. Máx. 2 aplic/año	
			Fludioxonil	Geoxe 50 WG	Preventivo. Máx 2 tratam/año.	
			Fluopyram*	Luna Privilege*	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	
			Hidrogenocarbonato de potasio	Armicarb Garden, Karbicure 85	Preventivo y curativo. Máx 6 tratam./año.	
			Isofetamida	Kenja	Preventivo y curativo. Máx 1 tratam./año.	
			Tebuconazol*	Folicur 25 EW*, Tenor*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	
			Tebuconazol*	Song*, tebuzol*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	
			Tebuconazol+trifloxistrobin*	Flint Max*	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	
J (cuajado)	**Mildiu**	**M2**	**Grupo M2: Fungicidas antimildiu penetrantes** (mezclados con materias activas de contacto según formulación).			
			Ametoctradin	Enervin, Enervin SC	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año (Enervin SC) y máx. 3 aplic/año (Enervin)	Tienen capacidad de penetración en la planta (no se mueven dentro de ella). No se lavan si trascurre 1 hora sin llover después de tratar.
			Amisulbrom	Leimay	Preventivo y antiesporulante. Máx. 3 aplic/año	Alternar materias activas.
			Azoxistrobin**	Quadris**	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	* No es penetrante pero se incluye en este grupo por su particular modo de fijación.
			Ciazofamida*	Aliado CF*, Daramun*	Preventivo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año	** Controla también oidio.
			Cimoxanilo	Tricco 45 WG, Xanilo 45 WG, Sacron	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 4 aplic/año.	AAC: Amidas del Ácido Carboxílicio. Máx. 3 tratam./año incluidos grupos M1 y M2.
					Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año	.
			Cimoxanilo+folpet	Ci-Folk, Foltel	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año	
			Cimoxanilo + zoxamida	Electis CX, Milraz Pro	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año	
			Folpet + oxatiapiprolin	Zorvec Vinabria	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año	
			Mandipropamid (AAC)+ zoxamida	Ampexio	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año	
			Mandipropamid (AAC)+oxatiapiprolin	Orondis Ultra	Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año	
			Oxatiapiprolin + zoxamida	Zorvec Vinabel	Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año	
			Piraclostrobin**	Cabrio**		
	Botritis	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos**. Elegir 1 formulado del **grupo B**.			
K (tamaño guisante)	**Mildiu**	**M2**	Fungicidas antimildiu penetrantes. Elegir 1 formulado del **grupo M2**.			
	Oidio +Ar.roja/acariosis		Azufre	Varios		
	Oidio	**O**	Grupo de fungicidas antioidios. Elegir 1 formulado del **grupo O**, o utilizar compuestos a base de azufre mojable (varios). No aplicar a temperaturas superiores a 28ºC.			
	Botritis	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos.** Elegir 1 formulado del **grupo B**.			
K-L (tamaño guisante – cierre racimo	**Mildiu**	**M2**	Fungicidas antimildiu penetrantes. Elegir 1 formulado del **grupo M2**.			
	Botritis	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos.** Elegir 1 formulado del **grupo B**.			
M (inicio envero)	**Mildiu**	**M3**	**Grupo M3: Fungicidas antimildiu de contacto** (pueden estar mezclados con otras materias activas de contacto).			
			Hidróxido cúprico	Varios	Preventivo.	Pueden emplearse los distintos formulados a base de cobre autorizados en el cultivo.
			Oxicloruro de cobre	Varios	Preventivo.	No tienen capacidad de penetración en la planta.
			Oxido cuproso	Varios	Preventivo.	Se lavan con lluvias mayores a 10mm. (Volver a tratar).
			Sulfato cuprocálcico	Varios	Preventivo.	
	Botritis	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos.** Elegir 1 formulado del **grupo B**.			
N (maduración)	**Mildiu**	**M3**	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del **grupo M3**.			
	Botritis	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos.** Elegir 1 formulado del **grupo B**.			
Antes de vendimia	**Botritis**	**B**	**Grupo de fungicidas antibotríticos.** Elegir 1 formulado del **grupo B**.			Respetar los plazos de seguridad de los productos. Dirigir el tratamiento hacia los racimos.
	Podredumbre ácida		Deltametrin	Deltaplan, Audace, Deltagri, Decis	Amplio espectro insecticida. Máx. 3 aplic/año	Contacto e ingestión. Efecto repelente en otros insectos
Inicio caída de hojas	**Mildiu**	**M3**	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del **grupo M3**.			Tratamiento posterior a vendimia.

LANDARE-BABESERAKO ZENTROA
CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL
Parque Tecnológico.
Ibaizabal Bidea, edificio 502.
48160 DERIO. Tel.: 94 454 10 09
e-mail: sanidad.vegetal@bizkaia.eus

- **Araña roja y polilla:** se tratarán en función de las recomendaciones del contestador automático y la página web.
- **Granizada**: realizar cuanto antes un tratamiento fungicida con folpet.
- **Contestador automático** del Centro de Protección Vegetal: 94-4066879. Ofrece información semanal de la evolución de los distintos patógenos durante la campaña. Llamar a partir del 1 de Mayo.
- Guía confeccionada según actualización del MAPA del 26/01/2026.