

## Guía de tratamientos recomendados para perales 2022

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Observaciones
<b>A</b>	<b>Pulgones / Psila / Erinosis</b>	Aceite de parafina	Varios	
<b>A-B</b>	<b>Moteado / Chancros / Bacteriosis</b>	Cobre	Varios	
<b>C-D</b>	<b>Moteado / Chancros / Bacteriosis</b>	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	<b>Erinosis</b>	Azufre mojable Fenpiroximato	Varios Flash UM*	*Realizar un solo tratamiento al año.
	<b>Pulgones</b>	Fluconamid Pirimicarb	Teppeki, Afinto Aphox, Kílsec	
<b>G</b>	<b>Moteado</b>	<b>Grupo M: fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo.</b>		
		Ciprodinil Ciprodinil+Fludioxinil Difenoconazol Dodina Kresoxim-metil Tebuconazol Tetraconazol Trifloxistrobin	Chorus Switch*, Astound* Score 25 EC, Lexor, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Folicur 25 WG Emerald, Galileo Flint, Consist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. <u>Alternar</u> el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias.  *Controla también monilia.
	<b>Monilia</b>	<b>Grupo MON : fungicidas con efecto antimonilia</b>		
		Boscalida+piraclostrobin Ciprodinil+fludioxinil	Bellis* Switch*, Astound*	*Controla también moteado.
	<b>Stemphylium</b>	<b>Grupo S.: fungicidas con efecto contra stemphylium</b>		
Ciprodinil+Fludioxinil Fludioxinil Kresoxim-metil Trifloxistrobin		Switch*, Astound* Geoxe Stroby WG, Discus Flint, Consist	*Controla también monilia.	
<b>Pulgones</b>	Flonicamid Lambda-cihalotrin Pimetrozina Spirotetramat	Teppeki, Afinto Karate Zeon*, Kendo* Plenum Movento Gold**	*Controla también psila y agusanado. Máximo una aplicación anual.  **Aplicar desde caída de pétalos a inicio de maduración. También tiene efecto de control sobre psila y cochinillas.	
<b>Tratar cada 12 días en función de la necesidad</b>	<b>Moteado</b>	Fungicidas con efecto antimoteado de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.		
	<b>Stemphylium</b>	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
<b>A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.</b>	<b>Agusanado</b>  Avisos en telef. 94-406 68 79	Spinosad Abamectina + clorantropilol Clorantropilol	Spintor 480 SC Voliam targo** Coragen **, Voliam**	*Efecto contra pulgones y psila.  **Controlan también psila y minadoras Máximo dos aplicaciones anuales.
<b>A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.</b>	<b>Psila</b>  Avisos en telef. 94-406 68 79	Abamectina Spirotetramat Spinetoram	Vertimec Movento Gold Delegate WG*	*Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado.
<b>Engrosamiento de frutos - Maduración</b>	<b>Monilia</b>	Fungicidas con efecto antimonilia. Elegir un formulado del grupo MON.		
	<b>Stemphylium</b>	Fungicidas con efecto contra stemphylium. Elegir un formulado del grupo S.		
	<b>Moteado</b>	<b>Grupo MOT.: fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".</b>		
Ditianona		Delan WG	Tipo de acción penetrante. Realizar el tratamiento en las 36 horas posteriores al comienzo de las lluvias.	
<b>50% caída de hojas</b>	<b>Moteado</b>	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg. de cobre y 10 kg. de urea del 46 % por 100 litros de caldo.