

Guía de tratamientos recomendados para vid-txakoli 2021

Estado fenológico	Plaga o enferm.	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Actividad	Observaciones
A	Heridas poda	Resinas cicatrizantes	Varios		
C-D	Excoriosis	Folpet o Mancozeb	Varios		
	Acariosis / Erinosis	Fenpiroximato Etoxazol	Flash UM Borneo, Doryoku	Actividad eriofidos y tetraníquidos Máx. 1 aplic/año Actividad sólo sobre tetraníquidos	Por contacto e ingestión Por contacto e ingestión
E (+15 cm brote)	Mildiu	M1	Grupo M1: Fungicidas antimildiu sistémicos (mezclados con materias activas de contacto y/o penetrante según formulación).		
			Benalaxil-M + folpet Benalaxil M + cobre Cimoxanilo + fosefil-Al + zoxamida Fluopicolida + fosefil-Al Folpet + valifenalato (AAC) Fosetil-Al + cimoxanilo + folpet Fosetil-Al+iprovalicarb+folpet (AAC) Fosfonato potásico Fosfonato potásico + ditianona Iprovalicarb + folpet (AAC) Mancozeb + metalaxil-M Metalaxil + folpet Metalaxil-M + folpet	Fantic F**, Capri F**, Tempio F**, Saviran Star** Fantic A, Tempio A Electris Trio WDG Profler Emendo F*, Valis F*, Java F* Mikal-Plus, Pearze Triple Mikal Premium F** Cuneb Delan Pro Melody Combi WG Ridomil Gold MZ Pepite Sponsor combi, Metix Folpan Gold N	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Prev. y curativo. Máx. 1 aplic/año (máx. 1,1 kg/ha) Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo. Máx. 3 aplic/año Preventivo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año
F-G	Mildiu	M1	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del grupo M1.		
	Oidio +Ar.roja/acariosis		Azufre Fenpiroximato	Varios Flash UM	
F-G	Oidio	O	Grupo O: Fungicidas antioidio.		
			Boscailida* (1) Boscailida + kresoxin-metil (1+3) Ciflufenamid + difenoconazol (6+2) Fenbuconazol (2) Fluopyram + tebuconazol** (1+2) Flutriafol (2) Kresoxim-metil (3) Meptildinocap (5) Metrafenona (7) Penconazol (2) Piriofenona (9) Proquinazid (4) Proquinazid + tetraconazol (4+2) Spiroxamina (8) Tebuconazol* (2) Tebuconazol*+trifloxistrobin (2+3) Trifloxistrobin (3)	Cantus Collis Dynali Impala Star Luna Experience Impact Stroby WG, Dedalo WG, Tactic Karathane Star Vivando, Attenzo Star Topas 200 EW Kusabi Talendo Talendo Extra Spirox 500 EC, Prosper EC Folicur 25EW*, Tenor*, Darcos* Flint Max* Flint, Consist	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y erradicante. Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 4 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. 2 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año
I (inicio floración)	Mildiu	M1	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del grupo M1.		
	Botritis	B	Ciprodinil Ciprodinil + fludioxonil Fenhexamida Fenpirazamina Fludioxonil Isofetamida Tebuconazol* Tebuconazol+trifloxistrobin*	Tiguan, Qualy Switch, Astound Teldor Prolectus Geoxe 50 WG Kenja Folicur 25 EW*, Tenor* Flint Max*	Prev. y curativo. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año Preventivo. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 tratam/año. Preventivo. Máx. 2 tratam/año. Preventivo y curativo. Máx. 1 tratam/año. Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año
J (cuajado)	Mildiu	M2	Grupo M2: Fungicidas antimildiu penetrantes (mezclados con materias activas de contacto según formulación).		
			Ametoctradin + dimetomorf (AAC) Ametoctradin + metiram Amisulbrom Azoxistrobin** Ciazofamida* Cimoxanilo + mancozeb Cimoxanilo + zoxamida Dimetomorf + ditianona (AAC) Folpet + mandipropamid (AAC) Folpet + oxatiapropil Mandipropamid + zoxamida (AAC) Metiram*** Oxatiapropil + zoxamida Piraclostrobin**	Enervin duo SC Enervin duo Leimay Quadris** Mildicut* Micene Plus, Cikeyman Electis CX, Milraz Pro Forum Gold Pergado F Zorvec Vinabria Ampexio Polyram DF*** Zorvec Vinabel Cabrio**	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 2 aplic/año Preventivo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y antiesporulante. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y antiesporulante. Máx. 4 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 2 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo. Máx. 1 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año
K (tamaño guisante)	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del grupo B.		
	Mildiu	M2	Fungicidas antimildiu penetrantes. Elegir 1 formulado del grupo M2.		
K-L (tamaño guisante – cierre racimo)	Oidio +Ar.roja/acariosis		Azufre	Varios	
	Oidio	O	Grupo de fungicidas antioideos. Elegir 1 formulado del grupo O, o utilizar compuestos a base de azufre mojabable (varios). No aplicar a temperaturas superiores a 28°C.		
M (inicio enero)	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del grupo B.		
	Mildiu	M3	Hidróxido cúprico Oxicloruro de cobre Oxido cuproso Sulfato cuprocálcico	Varios Varios Varios Varios	Preventivo. Preventivo. Preventivo. Preventivo.
N (maduración)	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del grupo B.		
	Mildiu	M3	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del grupo M3.		
Antes de vendimia	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del grupo B.		
	Podredumbre ácida		Deltametrin	Deltaplan, Audace, Ritmus, Deltagri, Itaka, Decis	Amplio espectro insecticida
Inicio caída de hojas	Mildiu	M3	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del grupo M3.		